

La epidemia mundial de sida

- Desde el inicio de la epidemia, casi **60 millones de personas se han infectado** con el VIH y **25 millones de personas han fallecido** por causas relacionadas con el VIH.
- En 2008 había alrededor de **33,4 millones [31,1 millones–35,8 millones] de personas que vivían con el VIH**, y se produjeron unos **2,7 millones [2,4 millones–3,0 millones] de nuevas infecciones** y **2 millones [1,7 millones–2,4 millones] de defunciones relacionadas con el VIH**.
- En 2008, aproximadamente **430 000 [240 000–610 000] niños nacieron con el VIH**, con lo que se elevó a **2,1 millones [1,2 millones–2,9 millones]** el número total de niños menores de 15 años que viven con el VIH.
- **Los jóvenes** representaron alrededor del **40%** de todas las nuevas infecciones por el VIH en adultos (mayores de 15 años) a nivel mundial.
- **África subsahariana** es la región más afectada y **alberga al 67% de todas las personas que viven con el VIH** del mundo y el **91% de todas las nuevas infecciones entre niños**.
- En África subsahariana, la epidemia ha dejado **huérfanos a más de 14 millones de niños**.

Estadísticas regionales

	Personas que viven con el VIH	Nuevas infecciones por el VIH en 2008	Defunciones relacionadas con el sida en 2008	Prevalencia del VIH en adultos (%)
África subsahariana	22,4 millones [20,8 millones–24,1 millones]	1,9 millones [1,6 millones–2,2 millones]	1,4 millones [1,1 millones–1,7 millones]	5,2% [4,9%–5,4%]
Asia meridional y sudoriental	3,8 millones [3,4 millones–4,3 millones]	280 000 [240 000–320 000]	270 000 [220 000–310 000]	0,3% [0,2%–0,3%]
Asia oriental	850 000 [700 000–1,0 millones]	75 000 [58 000–88 000]	59 000 [46 000–71 000]	<0,1% [<0,1%]
América Latina	2,0 millones [1,8 millones–2,2 millones]	170 000 [150 000–200 000]	77 000 [66 000–89 000]	0,6% [0,5%–0,6%]
América del Norte	1,4 millones [1,2 millones–1,6 millones]	55 000 [36 000–61 000]	25 000 [20 000–31 000]	0,4% [0,3%–0,5%]
Europa occidental y central	850 000 [710 000–970 000]	30 000 [23 000–35 000]	13 000 [10 000–15 000]	0,3% [0,2%–0,3%]
Europa oriental y Asia central	1,5 millones [1,4 millones–1,7 millones]	110 000 [100 000–130 000]	87 000 [72 000–110 000]	0,7% [0,6%–0,8%]
Caribe	240 000 [220 000–260 000]	20 000 [16 000–24 000]	12 000 [9 300–14 000]	1,0% [0,9%–1,1%]

Oriente Medio y África del Norte	310 000 [250 000–380 000]	35 000 [24 000–46 000]	20 000 [15 000–25 000]	0,2% [<0,2%–0,3%]
Oceanía	59 000 [51 000–68 000]	3 900 [2 900–5 100]	2 000 [1 100–3 100]	0,3% [<0,3%–0,4%]
Total	33,4 millones [31,1 millones–35,8 millones]	2,7 millones [2,4 millones–3,0 millones]	2 millones [1,7 millones–2,4 millones]	0,8% [<0,8%–0,8%]

Fuente: *Situación de la epidemia de sida*, diciembre de 2009

Prevención del VIH

- El porcentaje de embarazadas VIH-positivas que recibían **tratamiento para prevenir la transmisión materno-infantil se incrementó del 35% en 2007 al 45% en 2008**.
- Los datos más recientes indican que menos del **40% de los jóvenes tienen información básica acerca del VIH** y menos del **40% de las personas que viven con el VIH conocen su estado serológico**.
- El número de nuevas infecciones por el VIH sigue aventajando a los números de personas que reciben tratamiento; por cada **dos personas que comienzan el tratamiento**, otras **cinco se infectan con el virus**.

Tratamiento

- Más de **4 millones de personas** en los países de ingresos bajos y medianos **tenían acceso al tratamiento** a fines de 2008, lo que constituye un aumento respecto de los aproximadamente 3 millones de personas que tenían acceso en 2007.
- Esto representa un **aumento del 36% en un año** y un aumento de 10 veces en un lapso de 5 años.
- Un cifra estimada de **700 000 personas recibían tratamiento en países de ingresos altos** en 2008, con lo que el **total mundial** ascendió a **4,7 millones** como mínimo.
- Pese a este progreso considerable, la cobertura mundial sigue siendo baja: en 2008, **sólo el 42% de las personas que necesitaban tratamiento tenían acceso a él (en comparación con el 33% en 2007)**.
- En 2008, sólo el **38% de los niños que necesitaban tratamiento** en países de ingresos bajos y medianos **lo recibían**.

Cobertura del tratamiento antirretrovírico (TAR), 2008

Región geográfica	Personas que recibían TAR, dic. 2008	Personas con necesidad de TAR, 2008	Cobertura del TAR, dic. 2008	Personas que recibían TAR, dic. 2007	Personas con necesidad de TAR, 2007	Cobertura del TAR, dic. 2007
África subsahariana	2,9 millones	6,7 millones	44%	2,1 millones	6,4 millones	33%
América Latina y el Caribe	445 000	820 000	54%	390 000	770 000	50%
Asia oriental, meridional y sudoriental	565 000	1,5 millones	37%	420 000	1,5 millones	29%
Europa, Asia central	85 000	370 000	23%	54 000	340 000	16%
Oriente Medio y África del	10 000	68 000	14%	7 000	63 000	11%

Norte						
Total	4 millones	9,5 millones	42%	2,97 millones	9 millones	33%

Fuente: *Towards universal access: scaling up priority HIV/AIDS interventions in the health sector: progress report 2009*, OMS/ONUSIDA/UNICEF, septiembre de 2009

Tuberculosis y VIH

- **Un tercio de las personas que viven con el VIH están coinfectadas con TB.** La tuberculosis es una de las principales causas de defunción entre las personas que viven con el VIH; no obstante, es curable y prevenible en la mayoría de los casos.

Disponibilidad y necesidades de recursos

- En 2008, se estimó que había **US\$ 15 600 millones disponibles** de todas las fuentes para el VIH.
- El ONUSIDA estima que **se necesitarán US\$ 25 000 millones** para los servicios relacionados con el VIH **en 2010**.

Contacto:

Oficina de prensa del ONUSIDA | +41 22 791 1697 | communications@unaid.org | www.unaids.org